



Laserbehandeling: perifere iridectomie

Inleiding

U heeft bij Oogkliniek Midden-Brabant een afspraak voor een behandeling met een laser om een verhoogde oogdruk te voorkomen. Een laser is een geconcentreerde lichtbundel waarmee heel precies het oog behandeld kan worden.

Vorbereiding op de behandeling

Houd u uw contactlenzen uit en draag liever geen make-up. Voor de behandeling krijgt u door ons oogdruppels toegediend.

De behandeling

Nadat uw oog door middel van een druppel is verdoofd, neemt u achter een apparaat plaats, zet uw kin in de kinsteun en uw voorhoofd tegen de voorhoofdsteun. U krijgt een vergrootglasje met speciale gel op uw oog. U voelt hier niets van.

De oogarts vraagt u om recht vooruit naar een vast punt te kijken. De laser maakt een kleine opening in de iris; dit is het gekleurde gedeelte van uw oog. U voelt als het ware een soort kleine "tikjes" tegen het oog. Deze zijn niet echt pijnlijk.

De behandeling duurt ongeveer tien minuten per oog.

Na de behandeling

Na afloop kunt u wat wazig zien. Dit valt over het algemeen mee. U kunt wel hoofdpijn krijgen door de pupilverkleinende druppels.

U krijgt van de oogarts ook een recept voor oogdruppels. Die druppels haalt u na de behandeling op bij uw apotheek en gebruikt u zoals voorgeschreven na de behandeling. Houd er rekening mee dat u vanwege het wazige zien na de behandeling niet zelf auto kunt rijden.

U moet zelf nog zeven dagen na de behandeling vier keer per dag druppelen in het behandelde oog.

Controle

Nadien plant u een nacontrole in bij de oogarts.

Complicaties

Het oog kan ontstoken raken. Het is dan ook belangrijk dat u uw oog goed druppelt.

Bij klachten binnen een week neemt u contact op via een mail aan

info@oogkliniekszuidnederland.nl. Daarnaast kunt met klachten contact opnemen met uw huisarts/ huisartsenpost.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.